

# MAXIVAC® Tetra Polvo y disolv. para susp. Inyect. para Perros



Composición por dosis (1 ml):

Sustancias activas:

Fracción liofilizada:

Virus del Moquillo Canino (CDV) atenuado, cepa Lederle  $\geq 10^4$  DICT<sub>50</sub>  
Adenovirus Canino, tipo 2 (CADNV-2) atenuado, cepa Manhattan  $\geq 10^4$  DICT<sub>50</sub>

Fracción líquida:

Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae inactivada  $\geq 10^9$  microorg.  
Leptospira interrogans serovar canicola inactivada  $\geq 10^9$  microorg.

**Forma farmacéutica**

Polvo y disolvente para suspensión inyectable.

**DATOS CLINICOS**

**Indicaciones de uso, especificando las especies de destino**

Perros: prevención del moquillo, hepatitis infecciosa canina, laringotraqueítis infecciosa canina (producida por el Adenovirus tipo 2) y leptospirosis canina (Leptospira icterohaemorrhagiae y Leptospira canicola), a partir de las 8 semanas de edad.

**Contraindicaciones**

No usar la vacuna en animales con posibles parásitos intestinales, en estado de estrés o que estén incubando una enfermedad infecto-contagiosa.

**Advertencias especiales para cada especie de destino**

Vacunar únicamente animales sanos y desparasitados.

**Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)**

Pueden producirse reacciones aisladas de hipersensibilidad en animales vacunados, en cuyo caso debe administrarse el tratamiento sintomático adecuado.

**Uso durante la gestación o la lactancia**

No administrar en hembras gestantes.

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No utilizar conjuntamente con otros productos.

### Posología y vía de administración

Perros: Administrar una dosis de 1 ml / perro por vía subcutánea a partir de las 8 semanas de edad (independientemente de su edad, peso, sexo y raza).

Programa vacunal recomendado:

Primera vacunación a las 8 semanas de edad.

Revacunación a las 12 semanas de edad.

Se aconseja la revacunación anual.

### DATOS FARMACEUTICOS

#### Precauciones especiales de conservación

Conservar entre +2 y +8 °C al abrigo de la luz, también durante el transporte. No congelar.

#### Presentaciones comerciales

Envase clínico de 10 dosis.

#### Número(s) de la autorización de comercialización

1464 ESP