

EQUIBACTIN® 333 mg + 67 mg Pasta Oral para Equinos



Trimetoprim 66,7 mg
Sulfadiazina 333,3 mg

Forma farmacéutica

Pasta oral.

DATOS CLÍNICOS

Especies de destino

Equinos.

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Tratamiento de infecciones en caballos provocadas por bacterias sensibles a la combinación de trimetoprim y sulfadiazina, especialmente:

Infecciones del tracto respiratorio asociadas con *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus aureus*;

Infecciones gastrointestinales asociadas con *E. coli*;

Infecciones urogenitales asociadas con estreptococos beta-hemolíticos;

Infecciones de heridas y abscesos abiertos o drenados asociados con *Streptococcus* spp. Y *Staphylococcus aureus*.

Contraindicaciones

No utilizar este medicamento en caballos que sean hipersensibles a las sulfonamidas, con insuficiencia hepática o renal grave o discrasias sanguíneas.

No utilizar este producto para tratar abscesos sin el drenaje adecuado.

Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Los animales tratados pueden experimentar disminución o falta de apetito.

Pueden desarrollarse heces sueltas y diarrea durante el tratamiento con el producto. Si aparecen estos efectos, interrumpir inmediatamente el tratamiento e instaurar el tratamiento sintomático oportuno.

Uso durante la gestación o la lactancia

Estudios de laboratorio en ratas y ratones han dado muestras de efectos teratogénicos. No se ha establecido la seguridad del producto durante el embarazo. Utilizar el medicamento sólo de acuerdo con la valoración de riesgos/beneficios que haga el veterinario responsable.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Se sabe que las sulfonamidas potenciadas empleados simultáneamente con la detomidina pueden provocar arritmias fatales en el caballo.

Posología y vía de administración

Vía de administración: Uso oral.

Tiempo(s) de espera

Carne y vísceras: 14 días

No se permite su uso en yeguas que produzcan leche para el consumo humano.

DATOS FARMACÉUTICOS

Precauciones especiales de conservación

No refrigerar ni congelar.

Presentaciones comerciales

Cada jeringa contiene 45 g de pasta.

Número(s) de la autorización de comercialización

1971 ESP