

## ADVANTAGE® 250 Para Perros



### Sustancia activa:

Imidacloprid 250 mg/pipeta (2,5 ml de solución al 10 %)

### Forma farmacéutica

Solución para unción dorsal puntual.

Solución transparente de color amarillo a pardusco.

### DATOS CLÍNICOS

#### Especies de destino

Perros

#### Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Para la prevención y tratamiento de las infestaciones por pulgas y tratamiento de las infestaciones por piojos masticadores (*Trichodectes canis*) en perros de peso comprendido entre 10 kg e inferior a 25 kg.

Para perros de peso inferior a 10 kg de peso o de 25 kg y de peso superior, emplear el medicamento Advantage para Perros adecuado.

Las pulgas en el perro son eliminadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación del medicamento. Un tratamiento previene una posterior infestación por pulgas durante cuatro semanas. El medicamento puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP), cuando ésta se haya diagnosticado previamente por un veterinario.

#### Contraindicaciones

No tratar a los cachorros no destetados de menos de 8 semanas de edad.

No usar en animales con hipersensibilidad a la sustancia activa o a alguno de los excipientes.

#### Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

El medicamento tiene un sabor amargo y de modo ocasional, si el perro lame el punto de aplicación inmediatamente después del tratamiento, puede producirse salivación. Este efecto no es un signo de intoxicación y desaparece al cabo de unos minutos sin necesidad de tratamiento.

En muy raras ocasiones, pueden producirse reacciones cutáneas tales como pérdida de pelo, enrojecimiento, picores y lesiones en la piel. También se ha notificado agitación y desorientación. Excepcionalmente, se ha notificado en perros salivación excesiva y signos nerviosos tales como descoordinación, temblor y depresión.

#### Uso durante la gestación o la lactancia

No se han observado efectos primarios embriotóxicos, teratogénicos o sobre la función reproductora durante los estudios efectuados con imidacloprid sobre ratas y conejos. Los estudios sobre las perras

en gestación y lactación junto con su camada son limitados. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia que sugiera que deban esperarse efectos adversos en estos animales.

### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No se ha observado incompatibilidad entre este medicamento a dos veces la dosis recomendada y los siguientes medicamentos veterinarios empleados comúnmente: fentión, lefenuron, milbemicina, febantel, pirantel y prazicuantel. Asimismo, se demostró la compatibilidad del medicamento con una amplia gama de tratamientos rutinarios bajo condiciones de campo incluyendo la vacunación.

### Posología y vía de administración

#### Dosificación y Esquema de tratamiento

Perro(kg peso)	Medicamento	Número de pipetas	Imidacloprid (mg/kg peso)
< 4 kg	Advantage 40 para Perros	1 x 0,4 ml	mínimo de 10
≥ 4 kg a < 10 kg	Advantage 100 para Perros	1 x 1,0 ml	mínimo de 10
≥ 10 a < 25 kg	Advantage 250 para Perros	1 x 2,5 ml	mínimo de 10
≥ 25 a < 40 kg	Advantage 400 para Perros	1 x 4,0 ml	mínimo de 10
≥ 40 kg	Advantage 400 para Perros	2 x 4,0 ml	mínimo de 10


Pueden seguir produciéndose reinfestaciones por aparición de nuevas pulgas en el ambiente durante seis semanas o más después de haber iniciado el tratamiento. En consecuencia, puede ser necesario más de un tratamiento, dependiendo de la cantidad de pulgas en el ambiente. Como ayuda, se recomienda el empleo adicional en el hábitat del animal de un tratamiento adecuado contra pulgas adultas y sus fases de desarrollo.

El medicamento sigue siendo eficaz aunque el animal se moje, por ejemplo después del baño o de una exposición a lluvia intensa. No obstante, en aquellos casos en que el baño es frecuente, puede ser necesario el retratamiento dependiendo de la presencia de pulgas en el ambiente. En estos casos no aplicar con una frecuencia superior a una vez por semana.

En caso de infestación por piojos masticadores, se recomienda un examen veterinario 30 días después del tratamiento dado que algunos animales pueden requerir un segundo tratamiento.


#### Forma de administración

Extraiga una pipeta del estuche. Para perros de 40 kg de peso y de peso superior use dos pipetas. Mantenga la pipeta derecha, gire el tapón y retírelo. Use el tapón colocado en sentido inverso para, mediante un giro, perforar la pipeta.




#### Para perros de menos de 25 kg de peso:

Con el perro en posición de pie, separe el pelo entre las escápulas hasta que la piel sea visible. Coloque la parte superior de la pipeta sobre la piel y apriete firmemente la pipeta varias veces para depositar todo su contenido.



**Para perros de 25 kg o de peso superior:**

Para facilitar la aplicación, le perro debe de estar en posición de pie. Se aplicará todo el contenido de la pipeta repartido uniformemente en tres o cuatro puntos sobre la línea dorsal del animal desde la zona escapular hasta la base de la cola. Separe el pelo de cada punto de aplicación hasta que la piel sea visible.



Coloque la parte superior de la pipeta directamente sobre la piel y apriete la pipeta con suavidad para depositar parte de su contenido.

**Para todos los perros:**

No aplicar una cantidad excesiva de la solución en un mismo punto ya que podría deslizarse por el costado del perro.

El medicamento tiene un sabor amargo y de modo ocasional, si el perro lame el punto de aplicación inmediatamente después del tratamiento, puede producirse salivación. Este efecto no es un signo de intoxicación y desaparece al cabo de unos minutos sin necesidad de tratamiento. Una aplicación correcta minimizará la oportunidad del perro de lamer el medicamento.

Aplicar únicamente sobre la piel sana. No dejar que los animales recién tratados se laman unos a otros.

## DATOS FARMACÉUTICOS

### Periodo de validez

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 5 años

### Precauciones especiales de conservación

No requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

### Presentaciones comerciales

Tamaño del envase 5 ml de solución por pipeta

Blister conteniendo 4 pipetas monodosis

Material del envase Pipeta y tapón de polipropileno blanco.

### Número(s) de la autorización de comercialización

1183 ESP