

Clínica
veterinaria:

Fecha: _____

Nombre del perro: _____

Raza: _____ Edad: _____ Peso: _____



Luxación de rótula

La luxación de rótula es el desplazamiento de la rótula de su sede habitual. Puede ser congénita (deformaciones anatómicas de la articulación de la rodilla), o consecuente a un traumatismo.

La luxación puede ser o bien medial (más frecuente, sobre todo en perros pequeños), o bien lateral (perros de gran tamaño). Esta enfermedad tiene diferentes grados de gravedad que van de 0 a 4, según la intensidad de los síntomas.

Tratamiento

Canidryl®
CARPROFENO 20 mg 50 mg 100 mg

_____ comprimidos cada _____ horas _____ días.

Recomendaciones Terapéuticas (marcar)

- Paseos cortos a paso lento.
Aumentar progresivamente (2-3 al día).

Programa de ejercicio pasivo

- Ejercicios limitados al plano sagital.
Evitar abducción, adducción y rotación. 2/3 veces día 10 min.



Medidas dietéticas y de manejo

- Control del peso, con manejo dietético, y si necesario, farmacoterapia.

Fisioterapia / Rehabilitación

- Sesiones de Electroestimulación Neuromuscular.

Especificar: _____

- Aplicar frío 15 min., 2-3 veces al día.
 Masajes: Extremidad afectada y también contralateral.
2/3 veces día 10 min.