

Clínica  
veterinaria:

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre del perro: \_\_\_\_\_

Raza: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_ Peso: \_\_\_\_\_



## Luxación de rótula

La luxación de rótula es el desplazamiento de la rótula de su sede habitual. Puede ser congénita (deformaciones anatómicas de la articulación de la rodilla), o consecuente a un traumatismo.

La luxación puede ser o bien medial (más frecuente, sobre todo en perros pequeños), o bien lateral (perros de gran tamaño). Esta enfermedad tiene diferentes grados de gravedad que van de 0 a 4, según la intensidad de los síntomas.

## Tratamiento

**Canidryl®**  
CARPROFENO 20 mg 50 mg 100 mg

\_\_\_\_\_ comprimidos cada \_\_\_\_\_ horas \_\_\_\_\_ días.

## Recomendaciones Terapéuticas (marcar)

- Paseos cortos a paso lento.  
Aumentar progresivamente (2-3 al día).

### Programa de ejercicio pasivo

- Ejercicios limitados al plano sagital.  
Evitar abducción, adducción y rotación. 2/3 veces día 10 min.



### Medidas dietéticas y de manejo

- Control del peso, con manejo dietético, y si necesario, farmacoterapia.

### Fisioterapia / Rehabilitación

- Sesiones de Electroestimulación Neuromuscular.

Especificar: \_\_\_\_\_

- Aplicar frío 15 min., 2-3 veces al día.  
 Masajes: Extremidad afectada y también contralateral.  
2/3 veces día 10 min.