

Clínica veterinaria: _____



Fecha: _____

Nombre del perro: _____

Raza: _____ Edad: _____ Peso: _____



Osteocondritis dissecans

Osteocondritis dissecans

La **ostecondritis dissecans** es un proceso degenerativo del cartílago articular que se caracteriza por el desprendimiento de un colgajo de cartílago en la articulación, frecuentemente en el hombro pero también en el codo, rodilla o tarso de perros en fase de crecimiento (4-8 meses) de razas grandes y gigantes. Suele provocar cojera de una o ambas extremidades delanteras. Mejora al descansar y empeora con el ejercicio físico si éste no es controlado. El tratamiento de elección es quirúrgico, consistente en la extracción del fragmento cartilaginoso libre, y el pronóstico es bueno, sobretudoo en perros jóvenes.

Tratamiento

Canidryl®
CARPROFENO

20 mg

50 mg

100 mg

_____ comprimidos cada _____ horas _____ días.

Programa de rehabilitación postquirúrgica

1-3 días post-cirugía

EJERCICIO

- Ejercicios de movilización pasiva (flexión-extensión del hombro). 2/3 veces día 10 min.



FISIOTERAPIA

- Electroestimulación Neuromuscular.

Especificar: _____

MASAJE

2/3 veces día 10 min.

- Cuello y columna.



- Extremidad afectada y contralateral.



- Movilización de la escápula.

4-14 días post-cirugía

EJERCICIO

- Ejercicios de movilización pasiva (flexión-extensión del hombro).

- Ejercicios de pedaleo.

- Estimulación del reflejo flexor.

- Estiramientos.



- Ejercicios activos: "dar la mano".



FISIOTERAPIA

- Estimulación Neuromuscular.

MASAJE

2/3 veces día 10 min.

- Miembro afectado y contralateral.

- Movilizar los tejidos circundantes.