

Clínica veterinaria:



Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre del perro: \_\_\_\_\_

Raza: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_ Peso: \_\_\_\_\_



## Displasia de cadera

La displasia de cadera es una alteración del crecimiento y desarrollo de esta articulación que habitualmente afecta a las dos extremidades. En estos casos, el fémur no encaja bien en la articulación de la pelvis y aparece dolor y degeneración articular. Se presenta frecuentemente en animales jóvenes y en crecimiento, de razas grandes.

Los animales afectados pueden presentar una disminución repentina de la actividad unida a un dolor intenso de las extremidades posteriores.

## Tratamiento

**Canidryl®**  
CARPROFENO

20 mg

50 mg


100 mg

\_\_\_\_\_ comprimidos cada \_\_\_\_\_ horas \_\_\_\_\_ días.

## Recomendaciones Terapéuticas (marcar)

### Programa de ejercicio

- Reducir el nivel de ejercicio por debajo del umbral de dolor de las caderas. Moderar los ejercicios intensos (correr, jugar al frisbee,...).
- Caminar en la arena.
- Nadar.
- Ejercicios de movilización pasiva (flexión-extensión de la cadera) 2/3 veces día 10 min.



### Medidas dietéticas y de manejo

- Control de peso:  
Control ingesta calórica + ejercicio + farmacoterapia.
- Facilitar una cama blanda al animal.

### Fisioterapia / Rehabilitación

- Sesiones de Electroestimulación Neuromuscular.

Especificar: \_\_\_\_\_

Masajes 2/3 veces día 10 min:

- Columna lumbar –sacra.



- Muslo y extremidad distal. Aplicar fricción transversalmente en el muslo con la pierna extendida.