

Clínica
veterinaria:



Fecha: _____

Nombre del perro: _____

Raza: _____ Edad: _____ Peso: _____



Fragmentación proceso coronoides

Patología provocada por la fragmentación de la porción ventromedial del cúbito que articula en el húmero. Provoca dolor, cambios inflamatorios y posible osteoartritis articular. Es necesaria la cirugía.

Tratamiento

Canidryl®
CARPROFENO

20 mg

50 mg

100 mg

_____ comprimidos cada _____ horas _____ días.

Recomendaciones Terapéuticas (ma

Programa de ejercicio

- Promover la locomoción: paseos cortos y lentos.
- Estiramientos.
- Ejercicios de pedaleo.
- Nadar.
- Ejercicios de movilización pasiva (flexión y extensión).
2/3 veces día 10 min.



Fragmentación
proceso coronoides

Fisioterapia / Rehabilitación

- Sesiones de Electroestimulación Neuromuscular.

Especificar: _____



Masajes 2/3 veces día 10 min:

- Miembro afectado + contralateral.
- Columna cervical.
(Para aumentar el tono muscular en caso de atrofia).
- Movilizar con precaución los tejidos perincisionales.
- Aplicar frío 15' 2-3 veces al día.



Fragmentación
proceso coronoides