

SABER MÁS SOBRE EL HIPERTIROIDISMO FELINO



Thiamacare[®] 10 mg/ml

 **Ecuphar**
An Animalcare Company


¿Qué es el hipertiroidismo?

El hipertiroidismo felino es una enfermedad endocrina común, especialmente a medida que los gatos envejecen. Los síntomas pueden ser difíciles de identificar, los más comunes son:

- **pérdida de peso a pesar de un apetito voraz**
- **aumento de la vocalización (maullidos)**
- **comportamiento extraño e hiperactivo**
- **pelo opaco, quebradizo y seco**

El hipertiroidismo es una enfermedad que se produce debido al exceso de hormonas tiroideas en la circulación.

La tiroides es responsable de la producción y liberación de dos hormonas muy importantes para regular el metabolismo de su gato: T3 y T4. Los niveles elevados de estas hormonas en la sangre están asociados con síntomas de hipertiroidismo.



A la palpación se puede notar un agrandamiento de la glándula tiroides.

¿Cuál es el tratamiento del hipertiroidismo?

El único tratamiento definitivo para el hipertiroidismo es **extirpar quirúrgicamente la glándula tiroides** o usar **yodo radiactivo** para destruir las células con función tiroidea alterada. Estos métodos tienen riesgos e inconvenientes.

Como alternativa, los casos de hipertiroidismo felino se pueden tratar con éxito mediante **medicación**.

La administración diaria de **Thiamicare®** reduce los niveles de hormonas tiroideas que circulan en la sangre de su gato y los mantiene dentro de niveles normales, revirtiendo los síntomas asociados al hipertiroidismo.



Cómo administrar Thiamacare® a su gato

Thiamacare® debe administrarse solo **sin comida**, directamente en la boca de su gato, **2 veces al día (mañana y noche)**.

Muchos gatos aceptan, sin problemas, la administración de soluciones orales directamente en la boca con ayuda de una jeringa. Otros gatos son un poco más nerviosos, en estos casos lo mejor que puede hacer es mantener la calma y la confianza siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Llene la jeringa dosificadora de Thiamacare® con la dosis correcta y asegúrese de que esté en un lugar de fácil acceso.
- 2 Sostenga a su gato de manera suave pero segura o pídale ayuda a otra persona.
- 3 Sostenga la cabeza de su gato con su mano detrás de las orejas e incline suavemente la cabeza de su gato hacia atrás.
- 4 Inserte la jeringa dosificadora en la comisura de la boca de su gato y administre el contenido en la boca. Tenga cuidado de evitar que el medicamento entre en contacto con su piel o boca.
- 5 Mantenga la cabeza de su gato inclinada hacia atrás y acarícielo suavemente la garganta para animarlo a tragar el medicamento.
- 6 Limpie la punta de la jeringa con un pañuelo de papel y deséchelo inmediatamente.
- 7 Lávese las manos con agua y jabón.

No dude en contactar con su veterinario si tiene alguna duda sobre la administración de Thiamacare® a su gato.



Si está embarazada o intenta quedar embarazada, no debe administrar el medicamento ni manipular la arena/vómitos de gatos tratados con Thiamacare®.

Mi gato tiene hipertiroidismo. ¿Y ahora qué?

A su gato le han diagnosticado hipertiroidismo ya que presenta una combinación de signos clínicos y un análisis de sangre con cambios en la hormona tiroidea T4. Este análisis de sangre también se utilizará para controlar la respuesta de su gato al tratamiento.

También se valorará el estado general, la función renal y cardíaca. Los gatos con hipertiroidismo pueden desarrollar otras enfermedades, como enfermedad renal crónica o problemas cardíacos. Una evaluación completa de su gato le permite obtener una visión general de su salud antes de comenzar el tratamiento.

Cómo iniciar el tratamiento

Su veterinario le indicará la dosis inicial estándar de Thiamacare® para su gato: **2,5 mg dos veces al día (mañana y noche)**, a menos que le señale lo contrario.

Dosis inicial:

.....

Cuándo administrar:

.....

Thiamacare® debe administrarse directamente en la boca de su gato, utilizando la **jeringa dosificadora** incluida en el estuche, y debe suministrarse **a la misma hora cada día**.

No administrar con alimentos.

Preste atención a cualquier cambio en los signos clínicos que mostraba su gato antes del diagnóstico de hipertiroidismo, así como nuevos signos de problemas de salud.

Consulte a su veterinario si tiene alguna dificultad o duda a la hora de administrar Thiamacare® a su gato.





10 mg/ml

Thiamacare®

Estabilización

Su gato será **monitoreado periódicamente** (consulte la tabla en la última página para la próxima cita) para evaluar la respuesta al tratamiento y lograr un control estable del hipertiroidismo.

Su veterinario puede ajustar la dosis de Thiamacare® de su gato de acuerdo con los resultados de los análisis de sangre. Cualquier cambio se realiza fácilmente con la jeringa dosificadora de Thiamacare® y se registra en la tabla de dosificación personalizada de su gato (en la parte posterior de este folleto).

También se reevaluará la función renal de su gato. Es común que haya cambios en los parámetros sanguíneos cuando se logra estabilizar el hipertiroidismo. Consulte a su veterinario en caso de duda y siempre que sea necesario.

Seguimiento a largo plazo

Su gato tendrá citas regulares hasta que los niveles de T4 alcancen valores estables dentro del rango de referencia y los síntomas disminuyan o desaparezcan por completo (consulte la tabla en la última página para ver cuándo será la próxima cita de su gato).

Thiamacare[®]

10 mg/ml

A completar por su veterinario en cada cita

Fecha	Peso	Signos clínicos	Valor T4 total (µg/dL)	Thiamacare [®] dosis (mg) x 2 veces/día	Fecha próxima consulta

¿Le ha dado la medicación a su gato hoy?

Utilice esta tabla para registrar diariamente cuándo le ha dado a su gato una dosis de Thiamacare[®].

Día	Semana 1		Semana 2		Semana 3	
	Mañana	Noche	Mañana	Noche	Mañana	Noche
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						



SELLO CLÍNICA

Este prospecto acompaña la prescripción de Thiamacare[®] como guía auxiliar tras el diagnóstico de hipertiroidismo y el tratamiento con Thiamacare[®] y no constituye material publicitario.