

FLUKIVER® Solución Inyectable para Ovino y Vacuno



Composición centesimal:

Closantel	5 g
Excipiente c.s.p.	100 ml

Forma farmacéutica

Solución inyectable.

DATOS CLINICOS

Especies de destino

Ovino y vacuno

Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Tratamiento de la distomatosis hepática (preventivo y curativo), oestrosis en fase larvaria, hipodermosis en fase subcutánea y nematodosis por hematófagos

Contraindicaciones

No se han descrito.

Advertencias especiales para cada especie de destino

En ciertas razas selectas de vacuno de carne estabulado (Charolés y sus cruces) existe cierta predisposición (2%) a reacciones generales de tipo anafiláctico.

No utilizar en hembras lactantes cuya leche sea destinada al consumo humano.

Reacciones adversas

Esporádicamente puede presentarse intensa inflamación en la zona inyectada que desaparece espontáneamente a partir del segundo a tercer día de aplicado el producto.

Uso durante la gestación o la lactancia

No presenta ninguna contraindicación durante estos períodos.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No administrar simultáneamente con antiparasitarios organoclorados.

Posología y vía de administración

- Ovidos: Distomatosis:
1 ml/10 kg p.v. (5 mg/kg) en dosis única.
Gastrointestinales y estrosis:
0,5 ml/10 kg p.v. (2,5 mg/kg) en dosis única.
Vía subcutánea.
- Bóvidos: Distomatosis y nematodosis gastrointestinales:
0,5 ml/10 kg p.v. (2,5 mg/kg) en dosis única.
Hipodermosis:
1 ml/10 kg p.v. (5 mg/kg) en dosis única.
Vía subcutánea

Tiempo de espera

Carne: 28 días.

DATOS FARMACEUTICOS

Precauciones especiales de conservación

Mantener en lugar fresco y seco y protegido de la luz.

Presentaciones comerciales

Envase de 1 vial de 250 ml.

Número de la autorización de comercialización

0201 ESP