

# RIPERCOL® Palomas

## COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada comprimido contiene:  
Levamisol (clorhidrato) .....20,00 mg

**Forma farmacéutica**  
Comprimidos.



## DATOS CLÍNICOS

### Indicaciones de uso, especificando las especies de destino

Palomas deportivas: Tratamiento de nematodosis gastrointestinales producidas por *Ascaridia columbae* y *Capillaria obsignata* sensibles al levamisol.

### Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa y/o a algún excipiente.  
No administrar en aves con menos de 4 semanas.

### Advertencias especiales para cada especie de destino

Todas las palomas deben de ser tratados simultáneamente.

Durante los 3 o 4 días posteriores al tratamiento el palomar tiene que ser limpiado y totalmente Desinfectado.

### Reacciones adversas (frecuencia y gravedad)

Puede observarse vómitos.

### Uso durante la gestación o la lactancia

No se han descrito contraindicaciones durante la puesta ni la incubación de los huevos.  
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo. No usar en las 4 semanas anteriores al inicio de la puesta.

### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

No administrar compuestos organofosforados desde 14 días antes hasta 14 días después de la administración de levamisol.

### Posología y vía de administración

Vía oral.

Dosis:

Paloma adulta: 20 mg de levamisol/animal (equivalente a 1 comprimido/animal).

Pichón: 10 mg de levamisol/animal (equivalente a medio comprimido/animal).

Para la infestación por áscaris: dosis única.

Para a infestación por capilaria, repetir la dosis a los 7 días.

Los comprimidos serán administrados individualmente, por ingestión forzada, tras ayuno de 24 horas.

Pasadas 3 horas de su administración los animales pueden ser alimentados de nuevo.

El calendario o momento del tratamiento debe basarse en factores epidemiológicos y ser personalizado para cada palomar. El programa de tratamiento debe establecerlo el veterinario.

### Tiempo(s) de espera

No procede.

## DATOS FARMACÉUTICOS

### Periodo de validez

Periodo de validez del medicamento veterinario acondicionado para su venta: 5 años.

Periodo de validez en uso del comprimido fraccionado: no conservar comprimidos fraccionados.

### Precauciones especiales de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30° C.

Proteger de la luz

### Presentaciones comerciales

Blister incoloro de PVC /Aluminio conteniendo 15 comprimidos

#### Formato:

Caja con 2 blisteres de 15 comprimidos (30 comprimidos).

### Número(s) de la autorización de comercialización

96 ESP