

# Marbodex<sup>®</sup>

Una solución rápida y eficaz  
también en **otitis purulentas** y  
por **bacterias Gram negativas**



ecuphar<sup>®</sup>

# Marbodex®

## Tratamiento de elección en otitis

*Pseudomonas spp* puede estar presente en un 15-20% de las otitis caninas




Compatible  
con Otoclean® u  
otros limpiadores  
óticos

- Marbofloxacin, Clotrimazol y Dexametasona.
- Antibacteriano, antifúngico, antiinflamatorio esteroide en suspensión ótica.
- Especies: perros.


### Clotrimazol

- Antifúngico azólico.
- Levaduras: *Malassezia spp*.



*Malassezia pachydermatis* está asociada entre un **30-80%** a las complicaciones bacterianas en las otitis externas caninas.

Clotrimazol altera la permeabilidad de la membrana.



### Dexametasona

Corticosteroide de potencia media que permite una rápida eliminación del dolor y la inflamación.


por bacterias Gram (-) y purulentas en perros

## Marboflaxacino


Las QUINOLONAS son un tratamiento de 2ª elección frente a gérmenes resistentes a otros antibióticos.

### Marboflaxacino

- Quinolona.
- Bactericida.
- Bajo nivel de resistencias
- Bacterias Gram (-): de elección en **otitis purulentas, *Pseudomonas spp* y enterobacteriáceas.**
- Bacterias Gram (+): *Staphylococcus spp* y *Streptococcus spp*



Principales agentes etiológicos involucrados en la otitis externa canina.



# OTOFARM

## OTOLOGÍA CLÍNICA



La gama **más completa**  
en Otolología clínica

*...y mucho más*



**OTOCLEAN®.** Composición: Ácido láctico 24,75 mg; Ácido salicílico 2,32 mg; Extractos de plantas 21,12 mg; Transcutol 52,8 mg; Excipiente c.s.p. 1 ml. Propiedades: contiene ingredientes queratolíticos, cerumenolíticos, emolientes, higienizantes e hidratantes que confieren al producto unas excelentes cualidades para la higiene y cuidado del canal auditivo externo del perro y gato manteniéndolo libre de acúmulos de suciedad, cerumen o secreciones. Especies de destino: Perros y gatos. Indicaciones: Prevención de otitis, higiene auricular, coadyuvante en el tratamiento de otitis. Presentación: Estuche con 16 frascos de 5 ml. Reg. n.º 9498. Uso veterinario.

**CONOFITE®.** Composición: Miconazol (nitrato) 23 mg, Prednisolona (acetato) 5 mg, Polimixina B (sulfato) 5500 U.I. Indicaciones: Tratamiento de las otitis externas y dermatitis de los perros y gatos, originadas por hongos, levaduras, bacterias Gram-positivas y Gram-negativas y Otodectes cynotis. Contraindicaciones: No administrar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas. No administrar en caso de perforación de tímpano ya que la polimixina B es un agente potencialmente ototóxico. Posología: 3-5 gotas en cada oído dos veces al día durante 7-14 días, efectuando un masaje en la base del oído a fin de lograr una distribución adecuada del producto en el conducto auditivo. N.º Registro: 8.59. Presentación: Suspensión tópica. Frasco de 20 ml. Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 Barcelona.

**OTIMECTIN®.** Gel ótico. Composición: Ivermectina 1 mg/gr. Especies de destino Gatos. Indicaciones: Tratamiento de la otitis producida por el ácaro de la especie Otodectes cynotis en gatos. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente o si la membrana timpánica está perforada o si los conductos auditivos externos obstruidos a causa de una inflamación crónica o si hay enfermedad sistémica. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Debe evitarse el uso simultáneo con fármacos que interaccionen con la glucoproteína P (p. ej., selamectina y piperazina). Periodo de validez: 30 meses. Presentación comercial: Tubo de aluminio de 10 gramos con una capa externa de poliuretano blanco, una capa interna de resina epoxídica y un tapón de rosca de polietileno. N.º Registro: 2687 ESP. Titular de la autorización de comercialización: Laboratorios Dr. ESTEVE, S.A. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 221. 08041 Barcelona.

**MARBODEX®.** Gotas óticas. Composición: 3,0 mg marbofloxacino, 10 mg de clotrimazol, 0,9 mg de dexametasona (equivalente a 1,0 mg de acetato de dexametasona). Indicaciones: tratamiento de otitis externas de origen bacteriano y fúngico, producidas respectivamente por bacterias sensibles al marbofloxacino y hongos, especialmente Malassezia pachydermatis, sensibles a clotrimazol. Contraindicaciones: No usar en perros con perforación de la membrana timpánica. No usar en caso de hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes. Presentación: 20 ml. N.º Registro: 3296 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Uso veterinario. Titular de la autorización de comercialización: Norbrook Laboratories Limited- Irlanda. Representante: Ecuphar Veterinaria S.L.U. Avenida Río de Janeiro 60-66, planta 13, 08016 Barcelona.